

Allegato A

Vaccini somministrati gratuitamente

Poliomielite (obbligatorio per bambini da 0-16 anni)

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 3°, 5° e 11° mese; richiami 6° anno e 12° - 18° anno;
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; bambini 0 - 16 anni

Difterite (obbligatorio per bambini da 0-16 anni)

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 3°, 5° e 11° mese; richiami 6° anno e 12° - 18° anno; richiami per adulti ogni 10 anni
<i>Gruppi a rischio</i>	personale sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dipendenti delle strutture sanitarie private della Provincia di Bolzano, liberi professionisti nel settore sanitario della Provincia di Bolzano, operatori della Croce Bianca, Croce Rossa, studenti e personale sanitario della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; personale delle scuole; educatori professionali delle strutture per minori.
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; bambini 0 - 16 anni; gruppi a rischio

Tetano (obbligatorio per bambini da 0-16 anni e per alcuni gruppi professionali sec. l'art. 1 della legge 292/63)

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 3°, 5° e 11° mese; richiami 6° anno e 12° - 18° anno; richiami per adulti ogni 10 anni
<i>Gruppi a rischio</i>	gruppi professionali sec. l'art. 1 della legge 292/63 personale sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dipendenti delle strutture sanitarie private della Provincia di Bolzano, liberi professionisti nel settore sanitario della Provincia di Bolzano, operatori della Croce Bianca, Croce Rossa, studenti e personale sanitario della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; personale delle scuole; educatori professionali delle strutture per minori; tutte le persone senza protezione contro il tetano
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; bambini 0 - 16 anni; gruppi a rischio

Pertosse (obbligatorio per bambini da 0-16 anni)

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 3°, 5° e 11° mese; richiami 6° anno e 12° - 18° anno; richiami per adulti ogni 10 anni
<i>Gruppi a rischio</i>	<u>Rischio per esposizione professionale</u> I soggetti a stretto contatto con neonati e bambini sono a rischio di contrarre la pertosse, ma anche soprattutto di trasmettere questa infezione a bambini nella prima fase di vita (quindi non ancora immunizzati). In particolare, diversi studi hanno dimostrato come gli operatori sanitari siano ad alto rischio di contrarre la pertosse, e che la trasmissione all'interno di strutture sanitarie di questi patogeni ponga un rischio sostanziale di severe patologie nosocomiali, in particolare nei neonati e negli immunocompromessi. Pertanto, per la protezione del neonato è consigliabile un richiamo con dTaP per: <ul style="list-style-type: none">• gli operatori dei reparti coinvolti nell'assistenza al neonato• gli operatori degli asili nido• tutte le altre figure che accudiscono il neonato

	<p><u>Persone a rischio per determinati condizioni</u> Per le donne al terzo trimestre di ogni gravidanza (idealmente intorno alla 28° settimana) (anche se vaccinato in una gravidanza precedente)</p> <p>personale sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dipendenti delle strutture sanitarie private della Provincia di Bolzano, liberi professionisti nel settore sanitario della Provincia di Bolzano, operatori sanitari della Croce Bianca, Croce Rossa, studenti e personale sanitario della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; personale delle scuole; educatori professionali delle strutture per minori</p>
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; bambini 0 - 16 anni; gruppi a rischio

Epatite B (obbligatorio per bambini da 0-16 anni)

<i>calendario vaccinale</i>	Nuovi nati, 3°, 5° e 11° mese
Gruppi a rischio	<p><u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u> In aggiunta alla vaccinazione universale per tutti i nuovi nati, si raccomanda la vaccinazione di tutti gli adulti non precedentemente vaccinati e appartenenti a categorie a rischio per l'infezione da epatite B. In particolare si raccomanda la vaccinazione nelle seguenti categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pazienti politrasfusi ed emofiliaci • Emodializzati e uremici cronici di cui si prevede l'ingresso in dialisi • Soggetti affetti da lesioni eczematose croniche o psoriasiche alle mani • Soggetti con infezione da HIV • Soggetti affetti da epatopatia cronica in particolare se correlata ad infezione da HCV (l'infezione da HBV potrebbe infatti causare un ulteriore aggravamento della patologia già in atto) • Tossicodipendenti • Soggetti istituzionalizzati in centri per persone con disabilità fisiche e mentali • Soggetti conviventi con soggetti affetti dalle condizioni sopraelencate <p><u>Rischio per esposizione professionale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale e personale del Servizio Sanitario Nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso, assistenza sanitaria nelle carceri; • soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità; • persone che si rechino per motivi di lavoro in aree geografiche ad alta endemia di HBV; • addetti al soccorso e al trasporto di infortunati e infermi;

	<ul style="list-style-type: none"> • personale di assistenza in centri di recupero per tossicodipendenti; • personale di istituti che ospitano persone con disabilità fisiche e mentali; • personale addetto alla lavorazione degli emoderivati; • personale religioso che svolge attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria; • personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, Comandi Municipali dei Vigili Urbani, appartenenti al Corpo forestale dello Stato; • addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; • tatuatori e body piercers • addetti al lavaggio di materiali potenzialmente infetti; • addetti ai servizi cimiteriali e funebri; • lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza e del pronto soccorso aziendale. <p><u>Persone a rischio per determinati comportamenti o condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conviventi e contatti di soggetti HBsAg positivi, indipendentemente dall'età • Vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti • Detenuti • Soggetti dediti alla prostituzione • Uomini che fanno sesso con uomini • Donatori di sangue appartenenti a gruppi sanguigni rari <p>personale sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dipendenti delle strutture sanitarie private della Provincia di Bolzano, liberi professionisti nel settore sanitario della Provincia di Bolzano, operatori della Croce Bianca, Croce Rossa, studenti e personale sanitario della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; personale delle scuole; educatori professionali delle strutture per minori.</p>
Offerta gratuita	secondo calendario vaccinale; bambini 0 - 16 anni; gruppi a rischio

Haemophilus influenzae tipo b (obbligatorio per bambini da 0-16 anni)

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 3°, 5° e 11° mese
<i>Gruppi a rischio</i>	<p><u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Asplenia di carattere anatomico o funzionale o soggetti in attesa di intervento di splenectomia in elezione • Immunodeficienze congenite o acquisite quali deficit anticorpale in particolare in caso di deficit della sottoclasse IgG2 o soggetti HIV positivi • Deficit del complemento • Soggetti riceventi trapianto di midollo o in attesa di trapianto di organo solido • Soggetti sottoposti a chemioterapia o radioterapia per il trattamento di neoplasie maligne. • Portatori di impianto cocleare
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; bambini 0- 16 anni; gruppi a rischio

Morbillo, Rosolia, Parotite (obbligatorio per bambini da 1-16 anni)

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 13° - 15° mese e 6° anno
<i>Gruppi a rischio</i>	<p><u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Immunodepressione con conta dei linfociti CD4\geq 200/mL• Infezioni da HIV con conta dei linfociti T CD4+ \geq 200/mL• Diabete• Malattie polmonari croniche• Alcolismo cronico• Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia• Deficienza dei fattori terminali del complemento• Malattie epatiche croniche gravi• Insufficienza renale/surrenalica cronica• Soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati• Soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate <p><u>Rischio per esposizione professionale</u></p> <p>In accordo con il Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita, si raccomanda che la vaccinazione sia attiva e gratuita per tutti gli adulti non immuni anche per una sola delle tre malattie oggetto della vaccinazione. I soggetti adulti non immuni devono essere vaccinati in tutte le occasioni opportune. Per tutte queste patologie il ricordo di aver avuto la malattia non può essere considerato affidabile.</p> <p>Al fine di ridurre il rischio di casi di rosolia in gravidanza e di rosolia congenita, deve essere proposta la vaccinazione a tutte le donne in età fertile che non hanno una documentazione di vaccinazione o di sierologia positiva per rosolia (procrastinando la possibilità di intraprendere una gravidanza per 1 mese). La vaccinazione deve essere somministrata in due dosi distanziate di almeno 4 settimane. La vaccinazione può essere effettuata anche in caso di suscettibilità ad una soltanto delle 3 malattie prevenute dal vaccino MPR.</p> <p>La vaccinazione con MPR degli operatori sanitari suscettibili è indispensabile sia per evitare il contagio dell'operatore stesso (basti rammentare la pericolosità del morbillo nell'adulto e della rosolia per le donne in età fertile), sia la possibile trasmissione di agenti infettivi ai pazienti, con possibili conseguenti epidemie nosocomiali.</p> <p>In particolare, devono essere approntati specifici programmi per vaccinare:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutte le donne suscettibili esposte ad elevato rischio professionale, in particolare le lavoratrici in asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado;• tutti gli operatori sanitari suscettibili. <p>personale sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dipendenti delle strutture sanitarie private della Provincia di Bolzano, liberi professionisti nel settore sanitario della Provincia di Bolzano, operatori della Croce Bianca, Croce Rossa, studenti e personale sanitario della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; personale delle scuole; educatori professionali delle strutture per minori;</p>
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; bambini 1- 16 anni; gruppi a rischio

Varicella (obbligatorio per bambini da 1-16 anni)

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 13° - 15° mese e 6° anno
<i>Gruppi a rischio</i>	<p><u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u></p> <p>Le seguenti condizioni patologiche sono considerate ad elevato rischio</p> <ul style="list-style-type: none">• Leucemia linfatica acuta in remissione, a distanza di almeno tre mesi dal termine dell'ultimo ciclo di chemioterapia e con parametri immunologici compatibili• Insufficienza renale/surrenalica cronica• Soggetti in attesa di trapianto d'organo• Infezione da HIV senza segni di immunodeficienza e con una proporzione di CD4 \geq 200/mL• Diabete• Malattie polmonari croniche• Alcoolismo cronico• Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia• Deficienza terminale del complemento• Epatopatie croniche• Soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati• Soggetti affetti da patologie del motoneurone• Soggetti destinati a terapia immunosoppressiva• Soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate• Donne in età fertile senza precedenti di varicella; la vaccinazione va praticata procrastinando la possibilità di intraprendere la gravidanza per 1 mese: <p>Si raccomanda la vaccinazione di soggetti suscettibili conviventi con persone affette da immunodepressione severa, allo scopo di proteggere al meglio questi soggetti ad elevato rischio, in quanto per essi non è raccomandata la somministrazione di vaccini vivi attenuati. Di seguito le categorie ascrivibili alla classe di "severità" di immunodepressione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Soggetti con AIDS o altre manifestazioni cliniche dell'infezione da HIV• Soggetti affetti da neoplasie che possono alterare i meccanismi immunitari• Soggetti con deficit dell'immunità cellulare• Soggetti con disammaglobulinemia o ipogammaglobulinemia• Soggetti in terapia immunosoppressiva a lungo termine <p>La condizione di suscettibilità viene definita in base al ricordo anamnestico di pregressa malattia, senza necessita di test sierologici di conferma.</p> <p><u>Rischio per esposizione professionale</u></p> <p>La presenza di fasce di suscettibilità alla varicella tra gli adulti (età nella quale l'infezione può assumere caratteri di maggiore gravità) e l'evidenza scientifica dell'insorgenza di diverse epidemie nosocomiali, rende necessario proporre attivamente questa vaccinazione a:</p> <ul style="list-style-type: none">• persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario. Prioritariamente la vaccinazione dovrebbe essere eseguita dal personale sanitario che è a contatto con neonati, bambini, donne gravide o con persone immunodepresse;

	<ul style="list-style-type: none"> operatori scolastici suscettibili (il ricordo anamnestico ha, per quanto riguarda la varicella, valori predittivi molto elevati) che sono a contatto con neonati e bambini e operano nei seguenti ambienti: asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie. <p>personale sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dipendenti delle strutture sanitarie private della Provincia di Bolzano, liberi professionisti nel settore sanitario della Provincia di Bolzano, operatori della Croce Bianca, Croce Rossa, studenti e personale sanitario della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; personale delle scuole; educatori professionali delle strutture per minori;</p>
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; bambini 1 - 16 anni; gruppi a rischio

Pneumococco

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 3°, 5° e 11° mese e adulti > 64 anni
<i>Gruppi a rischio</i>	<u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u> <ul style="list-style-type: none"> • Cardiopatie croniche • Malattie polmonari croniche • Diabete Mellito • Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool • Alcoolismo cronico • Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento • Presenza di impianto cocleare • Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia • Immunodeficienze congenite o acquisite • Infezione da HIV • Condizioni di asplenia anatomica o funzionale e pazienti candidati alla splenectomia • Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo) • Neoplasie diffuse • Trapianto d'organo o di midollo • Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine • Insufficienza renale/surrenalica cronica
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; gruppi a rischio; bambini 0 – 16 anni

Meningococco C/ACWY

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 13° - 15 °mese; adolescenti 12° - 18° anno
<i>Gruppi a rischio</i>	<u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u> <p>I soggetti affetti da determinate patologie sono esposti ad un incrementato rischio di infezione meningococcica invasiva. Pertanto, si raccomanda l'immunizzazione con vaccino anti-meningococcica coniugato nei soggetti affetti dalle seguenti condizioni patologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emoglobinopatie quali talassemia e anemia falciforme • Asplenia funzionale o anatomica e candidati alla splenectomia in elezione

	<ul style="list-style-type: none"> • Immunodepressione congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto d'organo, terapia antineoplastica o terapia sistemica corticosteroidica ad alte dosi) • Diabete mellito di tipo 1 • Insufficienza renale/surrenalica cronica • Infezione da HIV • Epatopatie croniche gravi • Perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento • Difetti congeniti del complemento (C5 – C9) • Difetti dei Toll like receptors di tipo 4 • Difetti della properdina • Soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate <p>personale sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dipendenti delle strutture sanitarie private della Provincia di Bolzano, liberi professionisti nel settore sanitario della Provincia di Bolzano, operatori della Croce Bianca, Croce Rossa, studenti e personale sanitario della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; personale delle scuole; educatori professionali delle strutture per minori;</p>
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; gruppi a rischio; bambini 1 - 18 anni

Meningococco B

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 3°, 4°, 6° e 13° mese
<i>Gruppi a rischio</i>	<p><u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u></p> <p>I soggetti affetti da determinate patologie sono esposti ad un incrementato rischio di infezione meningococcica invasiva. Pertanto, si raccomanda l'immunizzazione con vaccino anti-meningococcica coniugato nei soggetti affetti dalle seguenti condizioni patologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emoglobinopatie quali talassemia e anemia falciforme • Asplenia funzionale o anatomica e candidati alla splenectomia in elezione • Immunodepressione congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto d'organo, terapia antineoplastica o terapia sistemica corticosteroidica ad alte dosi) • Diabete mellito di tipo 1 • Insufficienza renale/surrenalica cronica • Infezione da HIV • Epatopatie croniche gravi • Perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento • Difetti congeniti del complemento (C5 – C9) • Difetti dei Toll like receptors di tipo 4 • Difetti della properdina <p>Soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate</p> <p>personale sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dipendenti delle strutture sanitarie private della Provincia di Bolzano, liberi professionisti nel settore sanitario della Provincia di Bolzano, operatori della Croce Bianca, Croce Rossa, studenti e personale sanitario della</p>

	Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; personale delle scuole; educatori professionali delle strutture per minori;
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; gruppi a rischio; bambini 0 - 16 anni

Vaccino anti Herpes Zoster

<i>calendario vaccinale</i>	Persone > 64 anni
<i>Gruppi a rischio</i>	<u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio a partire da > 50 anni</u> <ul style="list-style-type: none"> • Diabete mellito • Patologia cardiovascolare • BPCO • Soggetti destinati a terapia immunosoppressiva
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; gruppi a rischio

Vaccino anti Papilloma virus (HPV)

<i>calendario vaccinale</i>	adolescenti 12° – 18° anno
<i>Gruppi a rischio</i>	<u>Persone a rischio per determinati comportamenti:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Uomini che fanno sesso con uomini
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; gruppi a rischio;

Influenza

<i>calendario vaccinale</i>	Persone > 64 anni
<i>Gruppi a rischio (previsti dalla Circolare Ministeriale annuale)</i>	<u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u> Oltre ai soggetti a rischio per età la vaccinazione è raccomandata a tutti i soggetti oltre i sei mesi di vita nelle seguenti condizioni patologiche: <ul style="list-style-type: none"> • Malattie croniche dell'apparato respiratorio (incluse l'asma di grado severo, le displasie polmonari, la fibrosi cistica e la BPCO) • Malattie dell'apparato cardio-circolatorio (incluse le cardiopatie congenite e acquisite) • Malattie metaboliche quali diabete mellito o obesità con BMI>30 e gravi patologie associate • Soggetti affetti da patologie neoplastiche • Insufficienza renale/surrenalica cronica • Malattie epatiche croniche • Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale • Malattie ematologiche ed emoglobinopatie • Immunodeficienze congenite o acquisite compresa l'infezione da HIV e le forme di immunodepressione iatrogena da farmaci • Patologie per le quali sono programmati interventi di chirurgia maggiore • Patologie associate a un incrementato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie quali le malattie neuromuscolari • Soggetti splenectomizzati • Bambini o adolescenti in terapia a lungo termine con acido acetilsalicilico a rischio di sviluppare sindrome di Reye in caso di sopraggiunta infezione influenzale • Soggetti di qualunque età residenti in strutture socio-sanitarie, in

	<ul style="list-style-type: none"> particolare anziani e • disabili • Soggetti conviventi con persone appartenenti a categorie a elevato rischio <p><u>Rischio per esposizione professionale</u></p> <p>Le categorie di lavoratori indicate nella Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medici e personale sanitario di assistenza; • Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori: <ul style="list-style-type: none"> a) Forze di polizia; b) Vigili del fuoco; c) Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolanti allo svolgimento della loro attività lavorativa; d) Lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività (è pratica internazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro a tale categoria di lavoratori). • Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: <ul style="list-style-type: none"> a) allevatori; b) addetti all’attività di allevamento; c) addetti al trasporto di animali vivi; d) macellatori e vaccinatori; e) veterinari pubblici e libero-professionisti <p><u>Persone a rischio per determinati comportamenti o condizioni</u></p> <p>Dato che la gravidanza si accompagna a un aumentato rischio di infezione influenzale di grado severo, in particolare qualora si associno ulteriori comorbidità, si raccomanda di effettuare la vaccinazione per tutte le donne che, all’inizio della stagione influenzale, si trovino nel secondo - terzo mese di gravidanza.</p> <p>Personale sanitario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, dipendenti delle strutture sanitarie private della Provincia di Bolzano, liberi professionisti nel settore sanitario della Provincia di Bolzano, operatori della Croce Bianca, Croce Rossa, studenti e personale sanitario della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; personale delle scuole; educatori professionali delle strutture per minori.</p>
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; gruppi a rischio

Rotavirus

<i>calendario vaccinale</i>	Bambini 3° - 7° mese
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale; bambini 0 – 16 anni a partire dalla coorte 2017

Epatite A

<i>Gruppi a rischio</i>	<u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u>
-------------------------	---

	<p>Soggetti affetti da epatopatia cronica (in conseguenza della maggiore suscettibilità di tali pazienti per l'insorgenza di forme fulminanti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pazienti con coagulopatie tali da richiedere terapia a lungo termine con derivati di natura ematica • Tossicodipendenti • Soggetti a rischio per soggiorni in aree particolarmente endemiche <p><u>Rischio per esposizione professionale</u> Il vaccino contro l'Epatite A è indicato per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavorano a contatto con primati infettati dal virus dell'Epatite A (HAV) • lavorano con HAV in strutture laboratoristiche <p><u>Persone a rischio per determinati comportamenti o condizioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bambini fino ai sei anni di età, figli di immigrati, che si recano in Paesi endemici o residenti in aree a maggiore rischio endemico • Uomini che fanno sesso con uomini
<i>Offerta gratuita</i>	gruppi a rischio

Meningo encefalite da zecca (TBE)

<i>Gruppi a rischio</i>	<p><u>Rischio per esposizione professionale</u> La vaccinazione è raccomandata per soggetti professionalmente esposti, in particolare lavoratori in aree endemiche e in zone rurali e boschive (es. contadini, militari).</p> <p><u>Persone a rischio per determinati comportamenti o condizioni</u> Tale vaccinazione è raccomandata, oltre che per i soggetti professionalmente esposti, per la popolazione residente in determinate aree rurali a rischio (stabilite valutando la situazione epidemiologica).</p>
<i>Offerta gratuita</i>	gruppi a rischio; tutti i residenti in Provincia di Bolzano